

Producent / Hersteller:
"VITAWAY" LLC
Yardanants Str., lane 2, bldg 4/39
0010 Yerevan, Republic of Armenia

**Wyłączny dystrybutor /
Einzigiger Vertriebspartner:**
Narum Lab sp. z o.o.
ul. Swieradowska 47
02-662 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 602 23 52
www.mynarum.com



Ulotka w środku / Faltblatt innen
/ Leaflet inside / Volantino
all'interno (PL, DE, EN, IT).

Narum
since 1954

Suplement diety
Nahrungsergänzungsmittel

Narum
+
Tabletka

Wzbogaca mikroflorę jelitową o żywe kultury unikatowej bakterii
Lactobacillus acidophilus szczep Er-2 317/402 Narine
Reichert die Darmflora mit lebenden Kulturen des einzigartigen Bakteriums
Lactobacillus acidophilus Stamm Er-2 317/402 Narine

30

Tabletek / Tabletten

Masa netto / Nettogewicht: 15 g

PROBIOTYK **NARINE**

PL Suplement diety **Narum Tabletka** w tabletkach ma na celu uzupełnienie mikroflory jelitowej w bakterie *Lactobacillus acidophilus* szczep Er-2 317/402 Narine. Suplement rekomendowany jest również w trakcie i po antybiotykoterapii dla uzupełnienia mikroflory jelitowej.

Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.

DE Nahrungsergänzungsmittel **Narum Tabletka** in Tablettenform dient der Ergänzung der Darmmikroflora mit *Lactobacillus acidophilus* Stamm Er-2 317/402 Narine. Das Nahrungsergänzungsmittel wird auch während und nach einer Antibiotikatherapie zur Ergänzung der Darmmikrobiota empfohlen.

Warnhinweise: Die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht zu überschreiten. Nicht einnehmen, wenn Sie allergisch oder überempfindlich auf einen der Produktinhaltsstoffe reagieren. Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollten. Schwangere und stillende Frauen sollten das Produkt nach Rücksprache mit dem Arzt verzehren.

Ważne informacje: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.

Wichtige Informationen: Die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht zu überschreiten. Nicht einnehmen, wenn Sie allergisch oder überempfindlich auf einen der Produktinhaltsstoffe reagieren. Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollten. Schwangere und stillende Frauen sollten das Produkt nach Rücksprache mit dem Arzt verzehren.

Składnik: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, *Lactobacillus acidophilus* szczep Er-2 317/402 Narine.
Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii na boku opakowania.
Mindestens halbar bis Ende: Datum und Chargennummer auf der Seite der Verpackung.
Zutaten: Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, *Lactobacillus acidophilus* Stamm Er-2 317/402 Narine.

* CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonie / kolonijbildende Einheit					
Składniki aktywne / Aktive Inhaltsstoffe	1 tab.	2 tab.	3 tab.	4 tab.	5 tab.
<i>Lactobacillus acidophilus</i> szczep / Stamm Er-2	1,6 x 10 ⁸ CFU*	3,2 x 10 ⁸ CFU*	4,8 x 10 ⁸ CFU*	6,4 x 10 ⁸ CFU*	8,0 x 10 ⁸ CFU*
6 tab.	9,6 x 10 ⁸ CFU*				

Skład zalecanej porcji (dziennie) / Zusammensetzung der empfohlenen Tagesdosis

PL Zalecana dzienna porcja do spożycia:
- Dzieci od 3 do 6 lat: 1-2 tabletki
- Dzieci od 6 do 12 lat: 1-3 tabletki
- Dorosli i dzieci powyżej 12 lat: 1-6 tabletek

DE Empfohlene Tagesdosis:
- Kinder von 3 bis 6 Jahren: 1-2 Tabletten
- Kinder von 6 bis 12 Jahren: 1-3 Tabletten
- Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: 1-6 Tabletten

Wie benutzt man: Tabletten sollten 15-20 Minuten vor einer Mahlzeit eingenommen werden. Es wird eine Einnahmedauer von mindestens 6 Wochen empfohlen. Falls erforderlich, zerdrücken Sie die Tablette.

tabletkę rozkruszyć.
Zaleca się przyjmować przez minimum 6 tygodni. W razie potrzeby: 15-20 minut przed posiłkiem.

Sposób użycia: tabletki należy spożywać 15-20 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmować przez minimum 6 tygodni. W razie potrzeby: 15-20 minut przed posiłkiem.