

Producent:
"VITAWAY" LLC
Vardanants Str., lane 2, bldg 4/39
0010 Yerevan, Republic of Armenia

Wytaczny dystrybutor:
Narum Lab sp. z o.o.
ul. Swieradowska 47
02-662 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 602 23 52
www.mynarum.com

Recommended by

NARINE
- ACADEMY -

Ulotka w środku / Faltblatt innen
/ Leaflet inside / Volantino
all'interno (PL, DE, EN, IT).


Korzystajmy z mądrości natury

Suplement diety

PoVir

Lactobacillus acidophilus
szczep Er-2 317/402 Narine

PROBIOTYK NARINE



Suplement diety PoVir w kapsułkach ma na celu uzupełnienie mikroflory jelitowej w bakterie *Lactobacillus acidophilus* szczep Er-2 317/402 Narine.

Suplement rekomendowany w trakcie i po antybiotykoterapii dla uzupełnienia mikrobioty jelitowej.

Składniki: *Lactobacillus acidophilus* szczep Er-2 317/402 Narine, otoczka kapsułki (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja żelująca: guma gellan).

⚠️ Warunki przechowywania: przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 10 °C. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Na czas transportu może być przechowywany poza warunkami chłodniczymi.

Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii na boku opakowania.

Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.

Skład zalecanej porcji dziennej:					
Składniki aktywne					
1 kapsułka	2 kapsułki	3 kapsułki	4 kapsułki	5 kapsułek	6 kapsułek
8 x 10 ⁸ CFU*	16 x 10 ⁸ CFU*	24 x 10 ⁸ CFU*	32 x 10 ⁸ CFU*	40 x 10 ⁸ CFU*	48 x 10 ⁸ CFU*
* CFU - Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię					
Lactobacillus acidophilus					
szczep Er-2 317/402 Narine					

Zalecana dzienna porcja do spożycia:

- Dzieci od 3 do 6 lat: 1-2 kapsułki
- Dzieci od 6 do 12 lat: 1-3 kapsułki
- Dorosli i dzieci powyżej 12 lat: 1-6 kapsułek

Sposób użycia: kapsułki należy spożywać 15-20 minut przed posiłkiem. Zaleca się przyjmować przez minimum 6 tygodni.

Pov-VI